



Vincent Lecomte
Bazège (31)
Tél : 05 62 71 79 36
lecomte@cetiom.fr



Franck Duroueix
Agen (47)
Tél : 05 53 98 36 79
duroueix@cetiom.fr



vendredi 20 novembre 2009

Charançons du bourgeon terminal : toujours présents



Suite à l'oléomail du 29 octobre concernant le risque charançon du bourgeon terminal (CBT), les conditions climatiques ont été très souvent défavorables à une intervention et à la protection des parcelles contre le CBT.

Or, malgré une baisse de l'intensité des captures sur le réseau SBT¹ colza de Midi-Pyrénées, les insectes sont toujours bien présents dans la grande majorité des parcelles (voir BSV² grandes cultures N°5 de Midi-Pyrénées). A noter toutefois que ces captures sont un indicateur qualitatif et non pas quantitatif.

Le risque de dégâts lié aux larves de CBT est donc toujours réel pour les parcelles qui n'ont pas été protégées à ce jour.

➔ Conseil

■ Sur Midi-Pyrénées, le Lot-et-Garonne, et le sud Dordogne

La lutte contre le charançon du bourgeon terminal (CBT) doit être raisonnée en fonction des dernières interventions insecticides.

- Sur les parcelles où un traitement insecticide a déjà eu lieu contre le CBT à partir du 26 octobre : aucun traitement n'est nécessaire.
- Sur les parcelles non traitées à ce jour ou ayant reçu un insecticide avant le 26 octobre : traitez dès à présent.
- Dans les autres secteurs : vigilance !

En cas de piégeage du CBT dans les cuvettes jaunes, traitez dans les 5 à 6 jours qui suivent les premières captures.

■■■ Info WEB espace SUD

BSV : un lien direct

– Midi-Pyrénées n°5 19 novembre 09

➔ rubrique actualité Sud : conseils infos et BSV

(<http://www.cetiom.fr/index.php?id=12671>)

R.T.R. Sud – 2009

Programme et inscriptions en ligne

- Toulouse Auzerville : 8 décembre
- Avignon : 16 décembre

(<http://www.cetiom.fr/index.php?id=3746>)

¹ SBT : Surveillance Biologique du Territoire

² BSV : Bulletin de Santé du Végétal